

Mikrobiologiniams tyrimams naudojamų mitybinių terpių, jų priedų reagentų, vienkartinių priemonių, stiklo ir diagnostinių rinkinių pirkimas

48 KATEGORIJA. MIKROBIOLOGINIAMS TYRIMAMS NAUDOJAMA MITYBINĖ TERPĖ IR JOS PRIEDAS-8

- Su preke pateikti gamybos partijos kokybės sertifikatą
- Būtina nurodyti gamintojo pavadinimą, prekės numerį, ir pateikti prekės aprašą ar nuorodą į siūlomą prekę.

48.1. Listeria agaras pagal Ottaviani ir Agosti (ALOA) arba lygiavertis reikalavimams

Reikalavimai:

• Sudėtis	g/ 930 ml
Fermentinis gyvūnų audinių hidrolizatas	18,0
Fermentinis kazeino hidrolizatas	6,0
Mielų ekstraktas	10,0
Natrio piruvatas	2,0
Gliukozė	2,0
Magnio glicerofosfatas	1,0
Magnio sulfatas (bevandenis)	0,5
Natrio chloridas	5,0
Ličio chloridas	10,0
Dinatrio vandenilio fosfatas	2,5
5-brom-4-chlor-3-indolil-β-	
D-gliukopiranozidas	0,05
Agaras	12,0 – 18,0*

* Atsižvelgiant į agaro gelio standumą

- pH $7,2 \pm 0,2$ (25°C temperatūroje)
- Pakuotė 250-500 g
- Terpė turi būti dehidratuota
- ALOA sukaupimo selektyvus priedas (48.1.1.) turi būti to paties gamintojo kaip ir terpė

Kiekis: 170 kilogramų

48.1.1. ALOA sukaupimo selektyvus priedas arba lygiavertis reikalavimams

Reikalavimai:

- Sudėtis: 500 ml terpės (48.1.)

Nalidiksininė rūgštis	10 mg
Ceftazimidas	10 mg
Cikloheksimidas*	25 mg
Polimiksinas B	38350 IU
L - α- fosfatidilinozitolis	1,0 g

Cikloheksimidas gali būti pakeistas amfotericino tirpalu – 5 mg/ 500 ml terpės
- Pakuotė 5-20 vnt.

Kiekis: 10000 vienetų