

ELUTAX ©

Vaistus išskiriantys balionas:

Revoliucine technologija gydymo vainikinių ir periferinių stenozei

- Naujas terapija, tačiau susipažinę PTA / PTK-kaip tvarkyti
- Vienas trumpas Paklitakselis paraiška, ilgalaikio praeinamumas
- Gydymas kaip PTA atskirai arba kartu su metaliniai stentai (BMS)

Dydžiai:

mm	10	13	15	20	25	30	40	60	80	100	150	200	250
1.50	10150	13150	15150	20150	25150	30150							
2.00	10200	13200	15200	20200	25200	30200	40200	60200	80200	100200	150200	200200	250200
2.25	10225	13225	15225	20225	25225	30225	40225						
2.50	10250	13250	15250	20250	25250	30250	40250	60250	80250	100250	150250	200250	250250
2.75	10275	13275	15275	20275	25275	30275							
3.00	10300	13300	15300	20300	25300	30300	40300	60300	80300	100300	150300	200300	250300
3.50	10350	13350	15350	20350	25350	30350	40350	60350	80350	100350	150350	200350	
4.00	10400	13400	15400	20400	25400	30400	40400	60400	80400	100400	150400	200400	
5.00				20500		30500	40500	60500	80500	100500	150500	200500	
6.00				20600		30600	40600	60600	80600	100600	150600	200600	

Su vaistais balionas (DEB), toliau plėtoti bendrą PTK / PTA kateterį. kad būtų užkirstas kelias restenozei, baliono paviršius yra padengtas su paklitakseliu. Trumpalaikis kontaktas su kraujagyslių sienelių yra pakankamas, teikti veiksmingą vaistų perdavimą.

Debiut registro (3)

"Paklitakselio dengtos balioniniai. . . [ELUTAX]. . . yra veiksmingas ir saugus PKI vainikinių arterijų


Bifurkacija pažeidimai, be klinikinių požymių, restenosis per 4 mėnesius sekti. Nors visi pacientai nustojo

Klopidogrelis per 3 mėnesius po indekso procedūros, iki šiol ne vėlu trombozė".

IASIS CE tyrimas (Bulgarija)

Gydomi 43 pacientai su stento Restenosis, ELUTAX

Angiografiniams tolesnių veiksmų po 6 mėnesių: 0% Restenosis (4)



Padengimo technologija Privalumai:

- Narkotikų Matrica gryo Paklitakselis (dviejų sluoksnių sniego ir ledo)
- Jokių papildomų Matrica būtina (pvz., polimeras)
- Net ir vientisa danga pripūstos balionų
- Apvalus 360 laipsnių dangos padengimo
- Minimalus vaistų praradimas per manevrą ar infliacijos $<3\%$
- saugus ir patikimas kiekybinis vaistų nusodinimo į indo sienelės (70% visų narkotikų)
- Nėra Įtrūkimai
- Vientisos narkotikų platinimo

Vertimas teisingas

2012 11 23

Karija t. lra.
klin. tyr. ir prod. spec.
Viktoras Federavicius

